



TITLE:

輸血後脾臓内「ヘモジデリン」沈着

AUTHOR(S):

森岡, 玉龜

---

CITATION:

森岡, 玉龜. 輸血後脾臓内「ヘモジデリン」沈着. 日本外科宝函 1939, 16(1): 1-6

ISSUE DATE:

1939-01-01

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/205071>

RIGHT:

日本外科寶函 第16卷 第1號  
ARCHIV FÜR JAPANISCHE CHIRURGIE  
XVI. BAND, 1. HEFT, 1. JANUAR 1939.

原 著

輸血後脾臓内ヘモジデリン<sup>1</sup>沈着

京都帝國大學醫學部外科學教室(磯部教授指導)

醫學士 森 岡 玉 龜

Haemosiderose der Milz nach Bluttransfusion.

Von

Dr. Tamaki Morioka

[Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitätsklinik Kyoto  
(Prof. Dr. K. Isobe)]

Seit jeher erweckte die Frage, ob die bei einer Bluttransfusion übertragenen roten Blutkörperchen längere Zeit im Kreisläufe des Empfängers erhalten bleiben, oder ob sie bald dem Untergange geweiht sind, grosses Interesse. Der Verfasser stellte experimentelle Untersuchungen an, um diese Frage zu klären. Das Resultat der Untersuchungen ergab folgendes:

1) Wenn man bei einem jungen Kaninchen auf pro kilogramm Körpergewicht 10 g Bluttransfusion anwendet, so lässt sich die Haemosiderinablagerung in der Milz 5 Tage nach der Bluttransfusion sehr schwach aber 8-10 Tage nach der Bluttransfusion am stärksten nachweisen.

2) Gebraucht man bei einem jungen Kaninchen auf je ein Kilogramm Körpergewicht 20 g Bluttransfusion, so ist die Haemosiderinablagerung in der Milz 4 Tage nach der Bluttransfusion sehr schwach aber 7-9 Tage nach der Bluttransfusion am stärksten.

3) Aus dem Gesagten folgt, dass die bei der Bluttransfusion übertragenen roten blutkörperchen kurze Zeit im Kreisläufe des Empfängers erhalten bleiben. Wahrscheinlich beginnt ihr Untergang bereits 2-3 Tage nach der Transfusion und ist 7-10 Tagen nach der Transfusion am stärksten.

## 内 容 目 次

|              |          |
|--------------|----------|
| 第1章 緒 言      | 第4章 第2實驗 |
| 第2章 實驗方法及ビ材料 | 第1節 實驗方法 |
| 第3章 第1實驗     | 第2節 實驗成績 |
| 第1節 實驗方法     | 第3節 實驗總括 |
| 第2節 實驗成績     | 第5章 實驗考察 |
| 第3節 實驗總括     | 第6章 結 論  |

### 第1章 緒 言

輸血時＝輸入セラレタ赤血球ハ、受血者ノ循環系統内＝於テ、長時日生存スルモノナルカ、或ハ又暫時＝シテ死滅スルモノナルカハ、古クヨリ興味ヲ以ツテ見ラレタ問題デアル。多クノ論文ヲ讀ム＝、副作用ナシ＝經過シタ輸血後ノ輸入赤血球ハ數週間ハ生存スルト考ヘルノ一般のセラレタガ、近時一部ノ著者ハ之＝賛意ヲ表スル＝反シ、他ノ者＝ハ數日間シカ生存シナイトノ見解ヲ發表スルモノモ見受ケラレル。

輸血後輸入赤血球ハ果シテ幾日間受血者ノ循環系統内＝生存スルヤノ問題＝解答ヲ與ヘントスルノガ本研究ノ目的デアル。

### 第2章 實驗方法及ビ材料

輸血後輸入赤血球ガ死滅スルト、血色素ハ分解シテ遂＝ $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ ナリ、凡ソ規則的＝諸臓器内＝沈着スルモノデアルガ、殊＝脾臓内沈着ハ最も顯著デアル事實＝着目シ、輸血後連続的＝日次ヲ追ツテ、脾臓内 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ ヲ組織學的＝檢出シ、ソノ結果＝依ツテ輸入赤血球ガ受血者ノ循環系統内＝生存スル日數ヲ察知セント欲スル。即チ輸血後順次得タル脾臓組織片ヲ Perls-Stiede 氏 $\text{L}$ ベルリン $\text{T}$ 青反應法＝ヨリ、明礬 $\text{L}$ カルミン $\text{T}$ 染色ヲ施行シ、 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ヲ検査ス。

但シ脾臓病理學部門學徒ノ見解＝從フト、健康ナ成長動物ノ脾臓内＝ハ生理的＝僅少 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ ガ存在スルノガ一般のデアル故＝、實驗動物＝ハ總テ生後50日以内ノ幼若家兔ヲ使用シ、輸血ハ正規ノ方法＝從ツテ間接輸血ヲ行フ。

### 第3章 第 1 實 驗

#### 第1節 實 驗 方 法

體重1疋＝就キ10.0瓦ノ割＝輸血ヲ行ヒ、輸血後2乃至30日ノ脾臓内 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ ヲ検査ス。

## 第2節 実験成績

実験成績ヲ表示スル。

| 番 號 | 生 後 日 數 | 體 重<br>(瓦) | 輸 血 後<br>生存日數 | 脾 臓 内 L へ<br>モジデリン <sup>7</sup> | 番 號 | 生 後 日 數 | 體 重<br>(瓦) | 輸 血 後<br>生存日數 | 脾 臓 内 L へ<br>モジデリン <sup>7</sup> |
|-----|---------|------------|---------------|---------------------------------|-----|---------|------------|---------------|---------------------------------|
| 2   | 42      | 550        | 2             | —                               | 25  | 45      | 490        | 11            | +                               |
| 3   | 42      | 530        | 2             | —                               | 26  | 45      | 500        | 11            | +                               |
| 4   | 42      | 480        | 3             | —                               | 30  | 42      | 470        | 12            | ++                              |
| 5   | 42      | 500        | 3             | —                               | 34  | 42      | 460        | 12            | +                               |
| 7   | 41      | 410        | 4             | —                               | 27  | 45      | 470        | 13            | +                               |
| 8   | 41      | 470        | 4             | —                               | 36  | 42      | 400        | 13            | +                               |
| 10  | 41      | 400        | 5             | ÷                               | 1   | 42      | 390        | 14            | +                               |
| 21  | 50      | 480        | 5             | ÷                               | 28  | 45      | 490        | 14            | +                               |
| 12  | 41      | 430        | 6             | —                               | 29  | 45      | 450        | 15            | +                               |
| 13  | 41      | 450        | 6             | +                               | 22  | 45      | 440        | 16            | +                               |
| 14  | 41      | 460        | 7             | ÷                               | 31  | 42      | 430        | 17            | +                               |
| 15  | 50      | 510        | 7             | +                               | 32  | 42      | 420        | 18            | ++                              |
| 17  | 50      | 500        | 8             | ++                              | 35  | 42      | 460        | 19            | +                               |
| 18  | 50      | 570        | 8             | +                               | 38  | 42      | 460        | 20            | +                               |
| 19  | 50      | 550        | 9             | +                               | 40  | 42      | 470        | 21            | +                               |
| 20  | 50      | 550        | 9             | ++                              | 9   | 41      | 400        | 28            | +                               |
| 23  | 45      | 470        | 10            | +                               | 41  | 42      | 410        | 29            | +                               |
| 24  | 45      | 430        | 10            | +                               | 6   | 41      | 450        | 30            | +                               |

## 第3節 実験總括

幼若家兎35匹ヲ用ヒテ、體重1疋ニ就キ10瓦ノ割ニ輸血ヲ行ヒタル後、脾臓内Lへモジデリン<sup>7</sup>沈着ヲ檢セル結果ヲ總括スルト次ノ如クデアル。

- 1) 輸血後4日迄ニハ脾臓ニLへモジデリン<sup>7</sup>沈着ハ認めラレナイ。
- 2) 輸血後5日ノ脾臓ニ弱イLへモジデリン<sup>7</sup>沈着ヲ認メル。
- 3) 輸血後6日ノ脾臓ニテハ、1例ニハLへモジデリン<sup>7</sup>沈着ヲ證明セズ。1例ニハ明瞭ニ之ヲ認メル。
- 4) 輸血後7日ノ脾臓ニテハ、1例ハ微弱ナLへモジデリン<sup>7</sup>沈着ヲ證明シ、1例デハ明瞭ニ之ヲ認メル。
- 5) 輸血後8乃至30日ノ脾臓ニハ明瞭ニLへモジデリン<sup>7</sup>沈着ヲ證明シ、輸血後8乃至9日ニシテ最モ著明ニ沈着増加セルヲ認メル。

## 第4章 第2實驗

## 第1節 實驗方法

體重1疋ニ就キ20瓦ノ割ニ輸血ヲ行ヒ、輸血後2乃至30日ノ脾臓内Lへモジデリン<sup>7</sup>ヲ檢査ス。

## 第2節 實驗成績

實驗成績ヲ表示ス。

| 番號 | 生後<br>日數 | 體重<br>(瓦) | 輸血後<br>生存日數 | 脾臓内 <sup>レ</sup> ヘ<br>モジデリン <sup>ヲ</sup> | 番號 | 生後<br>日數 | 體重<br>(瓦) | 輸血後<br>生存日數 | 脾臓内 <sup>レ</sup> ヘ<br>モジデリン <sup>ヲ</sup> |
|----|----------|-----------|-------------|--|----|----------|-----------|-------------|--|
| 42 | 32       | 320       | 2           | —  | 58 | 36       | 380       | 11          | +  |
| 60 | 40       | 420       | 2           | —  | 59 | 36       | 340       | 11          | +  |
| 44 | 32       | 300       | 3           | —  | 63 | 40       | 460       | 12          | ++                                       |
| 47 | 47       | 450       | 3           | —  | 65 | 40       | 420       | 12          | +++                                      |
| 45 | 32       | 310       | 4           | ÷  | 73 | 47       | 500       | 13          | +++                                      |
| 46 | 32       | 320       | 4           | —  | 78 | 47       | 510       | 13          | +  |
| 51 | 36       | 380       | 5           | —  | 67 | 40       | 530       | 14          | +  |
| 47 | 32       | 350       | 5           | +  | 68 | 40       | 470       | 14          | ++                                       |
| 48 | 32       | 370       | 6           | ÷  | 69 | 40       | 440       | 15          | +  |
| 49 | 32       | 300       | 6           | +  | 70 | 47       | 540       | 16          | +  |
| 50 | 36       | 360       | 7           | ++                                       | 71 | 47       | 520       | 17          | +  |
| 62 | 40       | 370       | 7           | +  | 72 | 47       | 570       | 18          | +  |
| 53 | 36       | 320       | 8           | +  | 75 | 47       | 530       | 19          | +  |
| 64 | 40       | 450       | 8           | ++                                       | 66 | 40       | 460       | 20          | +  |
| 54 | 36       | 400       | 9           | +++                                      | 61 | 40       | 430       | 21          | +  |
| 56 | 36       | 390       | 9           | +  | 55 | 36       | 400       | 28          | +  |
| 57 | 36       | 330       | 10          | ++                                       | 52 | 36       | 390       | 29          | +  |
| 73 | 47       | 510       | 10          | +  | 43 | 32       | 350       | 30          | +  |

## 第3節 實驗總括

幼若家兎35匹ヲ用ヒテ、體重1疋ニ就キ20瓦ノ割ニ輸血ヲ行ヒタル後、脾臓内<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ヲ檢セル結果ヲ總括スルト次ノ如クデアル。

- 1) 輸血後3日迄ニハ脾臓ニ<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ハ認メラレナイ。
- 2) 輸血後4日ノ脾臓ニテハ、1例ニハ微弱ナ<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ヲ認め、1例ニハ之ヲ認めナイ。
- 3) 輸血後5日ノ脾臓ニテハ、1例ニハ強イ内出血ヲ認メルガ<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ヲ證明セズ。1例ニハ<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ヲ明瞭ニ認メル。
- 4) 輸血後6日ノ脾臓ニテハ、1例ニハ微弱ナ、又1例ニハ明瞭ニ<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ヲ認メル。
- 5) 輸血後7乃至30日ノ脾臓ニハ概ネ著明ナル<sup>レ</sup>ヘモジデリン<sup>ヲ</sup>沈着ヲ證明シ、輸血後7乃至9日ニシテ急激ニ該沈着ノ増加ヲ認メル。

## 第5章 實驗考察

抑々赤血球ハ生理的ニモ病的ニモ迅速ニ崩壊シテ無核ノ斷片トナルモノデアリ、其ノ崩壊産物ハ生理的病的何レノ場合モ全ク同一ノモノト解セラレテキル。<sup>レ</sup>ヘモグロビン<sup>ヲ</sup>分子ガ分解スル時ニハ第1ニ<sup>レ</sup>ヘマチン<sup>ヲ</sup>ヨリ<sup>レ</sup>グロビン<sup>ヲ</sup>ヲ分離シ、後<sup>レ</sup>ヘマチン<sup>ヲ</sup>ヨリ諸種色素ヲ發生スルモノデアル。<sup>レ</sup>ヘマチン<sup>ヲ</sup>ハ漸次分解シテ鐵ヲ含マザル色素<sup>レ</sup>ヘマトイデン<sup>ヲ</sup>ト含鐵色素<sup>レ</sup>ヘモジデ

リン $\text{T}$  = 變化スルモノデアルコトハ現今一般ニ信ゼラレタ所デアル。 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ハ好  
ンデ脾臓、肝臓、腎臓、淋巴腺並ビニ骨髓等ノ實質性細胞ヲ主トシテ、尙間質細胞、網狀織内  
被細胞或ハ遊離細胞等ニモ來ルガ、特ニ脾臓ニハ著明ニ顯ハレ、所謂 Häm siderosis ト稱セラ  
レルコトハ周知ノ事實デアル。次ニ脾臓病理部門探究者ノ見解ニ從フト、健常成人又ハ成長動  
物ノ脾臓内ニハ生理的ニ $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ガ存スルトサレテキルガ、余ハ成長家兎ノ10脾臓  
ニ就イテ Häm siderosis ノ存否ヲ檢セシニ、4例ニ於テ微弱ナガラ陽性ノ結果ヲ見タ。然ルニ生  
後50日未滿ノ體重600瓦以下ノ幼若家兎10匹ノ脾臓ニ就イテ檢セシモ、 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ハ  
認メラレナカツタノデアル。コレハ Hueck, Biondi, Kunz, Weber 等ノ報告ト一致スル。以上ノ  
事實ニ立脚シテ、輸血後輸入赤血球ガ受血者ノ循環系統内ニ生存スル日數ヲ知ラントスルニハ、  
幼若家兎ヲ用ヒテ輸血後ノ脾臓内 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着時ヲ檢スルコトガ、最モ適當ト考ヘル。

扱テ輸血後受血者ノ循環系統内ニ移入サレタ赤血球ハ、果シテ如何ナル期間生存スルモノデ  
アルカ。コノ問題ニ關シ文獻ヲ参照シテ見ルニ、Ashby ハ自己ノ研究結果ニヨルト約100日生  
存スルト云ヒ、Uffreduzzi ハ約40日、Kramarenko ハ4乃至6週間生存スルト説ク。又Spitzmüller,  
Walton ハ輸入赤血球ノ生體染色検査ニヨリ、大部分ハ3乃至4週間證明出來ルト云ヒ、伊藤、  
松岡、稻垣ハ輸血後赤血球數、血色素量、血液總蛋白量及ビ赤血球滲透性抵抗度ヲ檢シタ結果、  
同族間接輸血ノ場合ニ輸入赤血球ハ比較の急速度ニ破壞セラレ、赤血球ノ大部分ノ生存期間  
ハ概ネ2乃至3週間ナラント推定スルト云フ。以上ハ輸入赤血球ノ生存期間ガ比較の長時日ニ互  
ルトナス著者デアルガ、之ニ反シ生存ハ短時日ニ過ギストナス著者モ亦見受ケラル。

即チ Ozereljev ハ1931年輸血後4乃至10日ニシテ脾臓並ビニ肝臓ニ鐵沈着ヲ發見シ、輸血後  
赤血球ハ間モナク崩壊シ初メ、崩壊ノ頂點ハ4乃至10日デアルト報告ス。又 Schultheiss ハ副  
作用ナシニ經過シタ輸血後4日ニシテ死ヲ轉歸フトツター婦人ノ脾臓ニ高度デハナイガ $\text{L}$ ヘモ  
ジデリン $\text{T}$ 沈着ヲ認メ、赤血球ノ崩壊ヲ證明シタ。次ニ Kunz 及ビ Weber ハ輸血後間モナク  
死亡セル患者ノ脾臓内ニ $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ ヲ證明シ、又幼若家兎ニ輸血後第1日ニ總例ノ77%ニ  
於テ、脾臓ノ絕對鐵總量ノ上昇ヲ定量的ニ證明シタコトヨリ、輸入赤血球ノ崩壊ハ間モナク初  
マルモノト解シ、數週間モ生存スルトナスコトハ眞デナイト主張ス。

斯ノ如ク輸血後輸入赤血球ノ生存期間ハ數週間デアルトナスモノト、更ニ短時日デアルト考  
ヘルモノトカアルガ、余ノ幼若家兎ヲ用ヒテナシタ實驗結果ヲ見ルト、體重1疋ニ就キ10瓦ノ  
割ニ輸血セルモノハ、輸血後5日ニシテ微弱ナ脾臓内 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ガ認メラレ、8乃至  
10日ニシテ最モ著明ノ沈着ヲ來シ、體重1疋ニ就キ20瓦ノ割ニ輸血ヲ行フ時ニハ、輸血後4日  
ニシテ弱イ脾臓内 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ガ見ラレ、沈着ハ7乃至9日ニシテ最モ著明トナルノデ  
アル。即チ輸血量ヲ増加スル時ハ多少早期ニ脾臓内 $\text{L}$ ヘモジデリン $\text{T}$ 沈着ガ見ラレルガ、概ネ相  
似タル結果ヲ來スモノデアル。余ハ上述ノ事實ニ基ヅキテ、輸血後輸入赤血球ハ受血家兎ノ循  
環系統ニ生存スルコト短カク、恐ラク輸血後2乃至3日ニシテ崩壊ヲ初メルモノデアリ、赤血  
球崩壊ハ輸血後7乃至10日ニシ最高頂ニ達スルモノト思惟スル。

## 第6章 結 論

1) 幼若家兎＝體重1疋＝就キ10瓦ノ割ニ輸血ヲ行フ時、脾臓内ヘモジデリン<sup>1</sup>沈着ハ、輸血後5日ニシテ僅ニ認メラレ、8乃至10日ニシテ著明トナル。

2) 幼若家兎＝體重1疋＝就キ20瓦ノ割ニ輸血ヲ行フ時、脾臓内ヘモジデリン<sup>1</sup>沈着ハ、輸血後4日ニシテ僅ニ認メラレ、7乃至9日ニシテ著明トナル。

3) 以上ノ事實ニ基ツキ輸血時輸入赤血球ハ受血家兎ノ循環系統内ニ生存スルコト短カク、恐ラク赤血球崩壊ハ輸血後2乃至3日ニシテ初マリ、7乃至10日ニシテ最高ニ達スルモノト思惟サレル。

## 主 要 文 獻

- 1) Ashby: J. of exper. med. 29, p. 267, 1919.
- 2) Ashby: J. of exper. med. 34, p. 127, 147, 1921.
- 3) Aschoff: Pathol. Anat. II Bd. S. 152.
- 4) Biondi: Beitr. path. Anat. 18, S. 174, 1895.
- 5) Görl: Dtsch. Arch. f. klin. med. 151, S. 311, 1926.
- 6) Hueck: Beitr. path. Anat. 54, S. 68, 1912.
- 7) Hubert Kunz, Herbert Weber: Arch. f. kl. Chir. 181, S. 263, 1934.
- 8) 伊東, 松岡, 稻垣: 北海道醫學雜誌, 13年, 12號, 2372, 昭和10年.
- 9) 板倉: 中央醫事, 9卷, 9號, 3, 昭和9年.
- 10) Karamarenko: Nov. Chir. Arch. 14, S. 193, 1928.
- 11) Kühl: Erg. inn. med. 43, S. 302, 1928.
- 12) Kunz: Arch. kl. chir. 173, S. 275.
- 13) Kunz u. Zacherl: Wien. kl. Wschr. Nr. 46, 1932.
- 14) Lauda: Erg. inn. med. 34, 1918.
- 15) Lauda u. Haam: Erg. inn. med. 40, 1931.
- 16) Ozerelziew: Nov. Chir. Arch. 24, S. 291, 1931.
- 17) 佐藤: 近世病理組織學檢査術式.
- 18) Weickel: Z. exper. med. 64, S. 336, 1929.
- 19) Spitzmüller, Walton: Wien med Wschr. Jg. 77, Nr. 10, S. 317, 1927.
- 20) Spitzmüller, Walton: Wien med Wschr. Jg. 77, Nr. 11, S. 350, 1927.
- 21) Spitzmüller, Walton: Wien med Wschr. Jg. 77, Nr. 12, S. 388, 1927.

## 附 圖 說 明

Fig. I. Nr. 54. 輸血後9日目脾臓内ヘモジデリン<sup>1</sup>沈着状態ヲ示ス. II. ハヘモジデリン<sup>1</sup>.

